

Qué esperar con la sedación moderada



Anestesia General

Se le administrará el medicamento por vía intravenosa o a través de una máscara respiratoria con un gas especial. Usted entrará en un sueño profundo. Usted no se moverá, no sentirá ningún dolor ni recordará el procedimiento.



Sedación moderada

Una enfermera le dará medicamentos para su procedimiento. Usted se sentirá somnoliento y puede quedarse dormido. Un toque ligero o sonidos leves pueden despertarlo fácilmente. Es posible que recuerde parte del procedimiento. Esto es normal.



Anestesia local / bloqueo nervioso

Le inyectarán medicamentos debajo de la piel. Esto adormece una pequeña parte de su cuerpo para el procedimiento. Estará despierto, pero cómodo.



Si se irá a casa el mismo día de su procedimiento, debe tener un adulto responsable mayor de 18 años de edad para llevarlo a casa. No se le permitirá conducir a casa o tomar un taxi, Uber o medicar por sí mismo. Verificaremos su transporte a casa antes del procedimiento. **Si no tiene un adulto responsable que lo acompañe después de su procedimiento, este se cancelará.**

Antes del procedimiento

- Siga las instrucciones con respecto a comer y beber, y qué medicamentos debe o no debe tomar antes del procedimiento.
- Su equipo de atención médica le colocará una vía intravenosa. Esto puede llevar más de un intento.

Durante el procedimiento

- Su equipo de atención lo monitoreará durante todo el procedimiento.
- Escuchar sonidos durante el procedimiento es normal, especialmente con la sedación.

Después del procedimiento

- Usted puede o no tener recuerdos de su procedimiento.
- Las enfermeras especialmente capacitadas lo monitorearán a medida que los efectos de la sedación desaparezcan.
- Algunas molestias pueden ser normales.
- Usted puede sentirse somnoliento, experimentar dolores musculares o escalofríos, o tener náuseas. Dígame a su equipo de atención para que puedan ayudarle a sentirse mejor.

Al irse a casa

- La sedación puede permanecer en su sistema hasta por 24 horas.
- NO conduzca, opere un vehículo, beba alcohol, tome decisiones importantes ni firme documentos legales durante 24 horas.
- Beba muchos líquidos y coma alimentos según lo tolere, a menos que su proveedor de atención médica le indique lo contrario. Tome los medicamentos según lo recetado y descanse en casa al cuidado de un amigo o familiar.