



Efectos secundarios de la anestesia general

Los miembros del equipo de anestesia suministran anestesia general a través de una vía intravenosa o una máscara respiratoria.

Náuseas y vómitos

La anestesia general y algunos analgésicos pueden causar náuseas o vómitos.

Consejos:

- No se fuerce a comer.
- Comience con líquidos claros y pruebe lentamente más alimentos sólidos, a menos que su médico indique lo contrario.
- Consulte a su médico si continúa vomitando.



Somnolencia

Es común sentirse somnoliento o aturdido hasta 12 horas después del procedimiento.

Consejos:

- Beba abundantes líquidos. La deshidratación es la causa más común de estos síntomas.
- No maneje ni opere maquinaria por 24 horas.
- No tome decisiones importantes ni firme documentos legales durante 24 horas.
- No beba alcohol ni tome medicamentos que le produzcan somnolencia durante 24 horas.



Dolor de garganta

La colocación de un dispositivo respiratorio en la garganta puede causar algo de dolor y ronquera.

Consejos:

- Beba abundantes líquidos.
- Trate de descansar la voz.
- Si el dolor continúa por más de una semana, comuníquese con su proveedor de atención médica.



Dolor

Es esperable sentir algo de dolor después de su procedimiento.

Consejos:

- Siga las instrucciones de su cirujano sobre los medicamentos para el dolor.
- Camine si puede hacerlo.

