



Efectos secundarios de la anestesia local/bloqueo nervioso

Entumecimiento y debilidad

Puede durar unas 24-48 horas hasta que el bloqueo nervioso desaparezca por completo.

Consejos:

- Por favor, pida a un adulto responsable que se quede con usted durante las primeras 12 horas porque el bloqueo nervioso puede limitar sus capacidades.
- No conduzca ni opere maquinaria hasta que el entumecimiento haya desaparecido y el movimiento normal haya regresado por completo.
- Por favor, póngase en contacto con su cirujano si el entumecimiento o la debilidad continúan después de 48 horas.



Somnolencia

Es común sentirse somnoliento o aturdido hasta 12 horas después del procedimiento.



Consejos:

- Beba abundantes líquidos. La deshidratación es la causa más común de estos síntomas.
- Cuando se ponga de pie y se mueva, asegúrese de tener a alguien disponible para que le brinde ayuda.

Dolor

Es probable que el dolor regrese una vez que el bloqueo nervioso haya desaparecido.

Consejos para limitar el dolor:

- Siga las instrucciones de su cirujano sobre los medicamentos para el dolor.
- Si el efecto de su bloqueo nervioso desaparece durante la noche, usted puede despertarse con mucho dolor. Antes de dormirse, considere tomar su analgésico según lo recetado, incluso si se siente cómodo.

